

19 — ESPÉCIES DA HILÉIA E DOS TABULEIROS ESPIRITOSANTENSES

A Geologia, o relêvo, a edafologia, a climatologia e fitoclimatologia, apresentados nos capítulos 9, 10 e 11 atinentes aos “Tabuleiros espiritosantenses” e a “Flora dos Tabuleiros” descrita no capítulo 16, são facilmente analisáveis, em termos de comparação com a Hiléia Amazônica do Terciário, já que a influência dos fatores comuns, que atuaram

tanto na flora Hiliéiana do platô terciário, como na flora espiritosantense de idêntico platô terciário. Conhecido em ambas, e mesmo na região Bahiana e do Estado do Rio de Janeiro, pelo nome de região dos "Tabuleiros", puderam se caracterizar por um número apreciável de espécies botânicas, como as que se seguem:

Na família das **LEGUMINOSAS**:

Andira retusa H.B.K., nome vulgar: Araroba. Morcegueira.

Copaifera reticulata Ducke., nome vulgar: Copaíba menor.

Dipteryx odorata Willd., nome vulgar: Cumará.

Apuleia praecox Mart., nome vulgar: Garapa.

Apuleia molaris Spruce., nome vulgar: Pau Mulato.

Swartzia psilonema Harms., nome vulgar: Jacarandá branco.

Hymenaea courbaril Linné., nome vulgar: Jutaí-assú.

Pithecia sclerocarpa Ducke., nome vulgar: Mucuna.

Zollernia paraensis Huber., nome vulgar: Pau Santo.

Bowdichia brasiliensis (Benth.) Ducke., nome vulgar: Sucupira do Amazonas.

Parkia pendula Benth., nome vulgar: Visgueira.

Parkia platycephala Bth., nome vulgar: Pau de Arara.

Stryphnodendron pulcherrimum (Willd) Hoehr; nome vulgar: Timbaúba.

Stryphnodendron purpureum Ducke., nome vulgar: Barbatimão.

Enterolobium maximum Ducke., nome vulgar: Tamboril.

Enterolobium schomburgkii Bth., nome vulgar: Timbaúba.

Acacia polyphylla DC., nome vulgar: Paricarana.

Mimosa sensitiva Linné., nome vulgar: Dormideira.

Mimosa polydactyla H.B.K., nome vulgar: Dormideira do bréjo.

Macrobium bifolium (Aubl.) Pers., nome vulgar: Araparirana.

Dialium guianense (Aubl.) Sandw., nome vulgar: Cururu ou Jataipeba.

Cassia multijuga Rich., nome vulgar: Cassia amarela.

Cassia apoucouita Aubl., nome vulgar: Cassia preta.

Na família das **MELIACEAS**:

Cedrela odorata Linné., nome vulgar: Cedro bordado.

Na família das **EUFORBIACEAS**:

Glycydendron amazonicum Ducke., nome vulgar: Mirindiba doce.

Na família das **MORÁCEAS**:

Helicostylis tomentosa (P. e E.) Rusby., nome vulgar: Jabotí.

Clarisia racemosa R. e Pav., nome vulgar: Oiti Coróia.

Pourouma aspera Tréc., nome vulgar: Puruma.

Na família das **Humiriáceas**:

Humirianthera duckei Hub., nome vulgar: Umiri.

Na família das **SIMARUBÁCEAS**:

Simaruba amara Aubl., nome vulgar: Pitomba.

Na família das ICACINÁCEAS:

Emmotum fagifolium Des., nome vulgar: Marachimbo.

Na família das MIRSINÁCEAS:

Virola surinamensis (Rol.) Warb., nome vulgar: Bicuiba branca.

Na família das GUTIFERAS:

Symphonia globulifera Linné., nome vulgar: Anani.

Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp., nome vulgar: Azedinho.

Tovomita guianensis Walp., nome vulgar: Azedinho.

Na família das PALMÁCEAS:

Orbygnya martiana B. Rdr., nome vulgar: Babassú.

Essas espécies, entre as mais importantes; contrando-se um número muito mais expressivo entre os arbustos e ainda mais elevado entre as plantas erbáceas e entre estas, é menos frequente o número de espécies epífitas que lhe são comuns. Pelo menos, uma centena de Gêneros de plantas arbóreas de grande porte de florestas do platô terciário ou "Tabuleiro" espiritosantense é comum ao platô terciário ou "Tabuleiro" da Hiléia Amazônica Brasileira, apenas citamos as principais, na relação acima, para evidenciar que se trata realmente de uma flora Amazônica em território espiritosantense.